

Traslazioni e iperbole

Equazione e grafico dell'iperbole


Esempio 1

Equazione

$$y = \frac{3}{x}$$

x	$y = \frac{3}{x}$
3	1
1	3
0	$\frac{3}{0}$ non esiste
-1	-3
-3	-1

**Campo di esistenza della formula:
insieme $\mathbb{R}_0$ dei numeri reali diversi da 0**



Equazione e grafico dell'iperbole


Esempio 2

Equazione

$$y = -\frac{3}{x}$$

x	$y = -\frac{3}{x}$
3	-1
1	-3
0	$-\frac{3}{0}$ non esiste
-1	3
-3	1

**Campo di esistenza della formula:
insieme $\mathbb{R}_0$ dei numeri reali diversi da 0**




Equazione e grafico dell'iperbole


Equazione

$$y = \frac{k}{x}$$

$k > 0$



$k < 0$



Al posto di k posso sostituire un qualunque numero reale. Esempi

k	$\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{3}$
$y = \frac{k}{x}$	$y = \frac{1}{2x} \Leftrightarrow y = \frac{1}{2x}$	$y = -\frac{2}{3x} \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3x}$

L'asse y è un asintoto dell'iperbole

La curva arriva a toccare l'asse y?


NO

Equazione dell'asse y: $x = 0$

x	0	...	0,0001	0,1
$y = \frac{1}{x}$	$\frac{1}{0}$ y non esiste	...	10000	10

Ma la curva si avvicina sempre più all'asse y, se sostituisco ad x numeri sempre più vicini a 0.

L'asse y è un **asintoto** dell'iperbole.



Asintoto parola di origine greca.
Significato: 'che non incontra'

Gli asintoti dell'iperbole

La curva arriva a toccare l'asse x?


NO

Equazione dell'asse x: $y = 0$

x	10	10000	...	$\frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{0}$ x non esiste
$y = \frac{1}{x}$	0,1	0,0001	...	0

Ma la curva si avvicina sempre più all'asse x, se sostituisco ad x numeri sempre più grandi positivi o sempre più piccoli negativi.

Anche l'asse x è un **asintoto** dell'iperbole.




Due archi separati
che si avvicinano
agli assi cartesiani


**Gli asintoti dell'iperbole
sono gli assi cartesiani**

Centro di simmetria dell'iperbole


Il punto O di intersezione degli asintoti è il centro di simmetria dell'iperbole.



Traslare un'iperbole



Traslo il piano



Iperbole con:

- centro $C = O(0; 0)$;
- asintoti gli assi cartesiani;
- equazione $y = \frac{3}{2x}$.

Iperbole con:

- centro $C = O'(3; 2)$;
- asintoti paralleli agli assi cartesiani.

E l'equazione dell'iperbole traslata?

Per rispondere ricordo come applicare le equazioni di una traslazione.

Applicare le equazioni di una trasformazione

Esempio	In generale
Traslazione che aggiunge 3 alle ascisse $\begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y \end{cases} \quad (*)$	Traslazione $\begin{cases} x' = x + p \\ y' = y + q \end{cases} \quad (^\circ)$
<p>I. Si applica la traslazione (*) per trasformare punti</p> <p>A (1; 2) diventa A' $\begin{cases} x' = 1 + 3 \\ y' = 2 \end{cases}$</p>	<p>I. Si applica la traslazione (°) per trasformare punti</p> <p>A (1; 2) diventa A' $\begin{cases} x' = 1 + p \\ y' = 2 + q \end{cases}$</p>
<p>II. Per traslare grafici si applica la trasformazione inversa</p> $\begin{cases} x = x' - 3 \\ y = y' \end{cases}$	<p>II. Per traslare grafici si applica la trasformazione inversa</p> $\begin{cases} x = x' - p \\ y = y' - q \end{cases}$
$y = 2x$ diventa $y' = 2(x' - 3)$	$y = 2x$ diventa $y' - q = 2(x' - p)$

Equazione di iperbole traslata


Esempio

ESEMPIO NUMERICO

Equazione dell'iperbole: $y = \frac{3}{2x}$

Traslazione $\begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y + 2 \end{cases}$ Inversa $\begin{cases} x = x' - 3 \\ y = y' - 2 \end{cases}$

Grafico



Equazione dell'asintoto verticale: $x' = 3$

Equazione dell'asintoto orizzontale: $y' = 2$

Centro di simmetria: $C(3, 2)$

Equazione dell'iperbole: $y' - 2 = \frac{3}{2(x' - 3)}$

Scrivo l'equazione in altra forma

Esplicito y' :

$$y' = 2 + \frac{3}{2(x' - 3)}$$

Eseguo le operazioni: $y' = \frac{4(x' - 3) + 3}{2(x' - 3)} = \frac{4x' - 12 + 3}{2x' - 6}$

Semplifico e ottengo

$$y' = \frac{4x' - 9}{2x' - 6}$$

Equazione di iperbole traslata


In generale

IN GENERALE

Equazione dell'iperbole: $y = \frac{k}{x}$

Traslazione $\begin{cases} x' = x + p \\ y' = y + q \end{cases}$ Inversa $\begin{cases} x = x' - p \\ y = y' - q \end{cases}$

Grafico



Equazione dell'asintoto verticale: $x' = p$

Equazione dell'asintoto orizzontale: $y' = q$

Centro di simmetria: $C(p, q)$

Equazione dell'iperbole: $y' - q = \frac{k}{(x' - p)}$

Scrivo l'equazione in altra forma

Esplicito y' :

$$y' = q + \frac{k}{x' - p}$$

Eseguo le operazioni, semplifico e ottengo

$$y' = \frac{ax' + b}{cx' + d}$$

Riconoscere l'equazione di un'iperbole con gli asintoti paralleli agli assi cartesiani


Ora dimentico traslazione e lettere con apici e concludo che:

Un'iperbole con centro $C(p, q)$ e asintoti paralleli agli assi cartesiani è descritta da una delle seguenti equazioni:

$$y = q + \frac{k}{x-p}$$

oppure

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}$$



Attività

Completa la scheda per tracciare il grafico di un'iperbole a partire dalla sua equazione.

Riflessioni sui risultati dell'attività

Quesito 1. Grafico di un'iperbole di equazione

$$y = \frac{k}{x}$$

Equazione	$y = -\frac{3}{x}$								
Equazione del tipo	$y = \frac{k}{x}$ con $k = -3$ Asintoti: gli assi cartesiani Centro di simmetria: O(0; 0)								
Procedimento per tracciare il grafico <ul style="list-style-type: none">• Disegna asintoti e centro O di simmetria.• Compila la tabella per trovare tre punti A, B, D a destra del centro di simmetria.• Disegna un arco che raccorda A, B e D.• Disegna l'arco simmetrico rispetto al centro O di simmetria.									
<table><tr><td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$-\frac{3}{x}$</td><td>$-\frac{3}{1} = -3$</td><td>$-\frac{3}{2}$</td><td>$-\frac{3}{3} = -1$</td></tr></table>	x	1	2	3	$-\frac{3}{x}$	$-\frac{3}{1} = -3$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{3} = -1$	
x	1	2	3						
$-\frac{3}{x}$	$-\frac{3}{1} = -3$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{3} = -1$						

Quesito 1. Grafico di un'iperbole di equazione

$$y = \frac{k}{x - p} + q$$

Equazione	$y = -\frac{3}{x-1} + 2$								
Equazione del tipo	$y = \frac{k}{x-p} + q \quad \text{con} \quad \begin{cases} k = -3 \\ p = 1 \\ q = 2 \end{cases}$ <p>Asintoti d'equazione $x = 1$ e $y = 2$</p> <p>Centro di simmetria: $C(1; 2)$</p>								
<p>Per tracciare il grafico</p> <ul style="list-style-type: none">• Disegna asintoti e centro C di simmetria.• Compila la tabella per trovare tre punti A, B, D a destra del centro di simmetria.• Disegna un arco che raccorda A, B e D.• Disegna l'arco simmetrico rispetto al centro C di simmetria. <table border="1"><tr><td>x</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>1</td></tr></table>	x	2	3	4	y	-1	$\frac{1}{2}$	1	
x	2	3	4						
y	-1	$\frac{1}{2}$	1						

Quesito 2. Grafico di un'iperbole di equazione

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Il procedimento più rapido per tracciare il grafico è basato sulla divisione di polinomi per ricondurre l'equazione alla forma $y = \frac{k}{x-p} + q$.

Esempio

Tracciare il grafico dell'iperbole d'equazione

$$y = \frac{2x - 5}{x - 1}$$

Divisione di polinomi

$$\frac{2x - 5}{x - 1} = (2x - 5) : (x - 1)$$

$$\begin{array}{r|l} \boxed{2x} - 5 & \boxed{x} - 1 \\ -2x + 2 & \mathbf{2} \\ \hline -3 & \end{array}$$

a. Divisione $\boxed{2x} : \boxed{x} = \mathbf{2}$

b. Moltiplicazione

$$\mathbf{2} (x - 1) = 2x - 2$$

c. Sottrazione

$$\begin{array}{r} 2x - 5 \\ -2x + 2 = -(2x - 2) \\ \hline \end{array}$$

$$2x - 5 = \mathbf{2}(\mathbf{x} - \mathbf{1}) - \mathbf{3}$$

$$\frac{2x - 5}{x - 1} = \frac{\mathbf{2}(\mathbf{x} - \mathbf{1}) - \mathbf{3}}{x - 1} = \mathbf{2} - \frac{\mathbf{3}}{x - 1}$$

$$\frac{2x - 5}{x - 1} = \mathbf{2} - \frac{\mathbf{3}}{x - 1}$$

Quesito 2. Grafico di un'iperbole di equazione

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}$$


Trovo che l'equazione

$$y = \frac{2x - 5}{x - 1}$$

si può scrivere nella forma

$$y = 2 - \frac{3}{x - 1}$$

Perciò abbiamo già
disegnato il suo grafico
nel quesito 1.



Procedimento per disegnare un'iperbole con gli asintoti paralleli agli assi cartesiani

Procedimento valido solo se l'equazione è del tipo


$$y = \frac{k}{x-p} + q$$

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Attenzione nel riconoscere l'equazione!


Riconoscere l'equazione di un'iperbole con gli asintoti paralleli agli assi cartesiani

Esempi per riflettere

Equazione	Del tipo $y = \frac{k}{x-p} + q$	Del tipo $y = \frac{ax+b}{cx+d}$	Non è equazione di iperbole con asintoti paralleli agli assi cartesiani
$y = \frac{x}{2} + 3$			$y = \frac{x}{2} + 3 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x + 3$ Del tipo $y = mx + q$ è l'equazione di una retta
$y = \frac{1}{2x} + 3$	$y = \frac{\frac{1}{2}}{x} + 3$ $k = \frac{1}{2}$ e $q = 3$		
$y = \frac{2x}{4x^2 + 3}$			$4x^2 + 3$ è di 2° grado
$y = \frac{2x}{4x + 3}$		$a = 2, b = 0,$ $c = 4, d = 3$	

Vocabolario matematico


L'iperbole che ha come
asintoti gli assi cartesiani



$$y = \frac{k}{x}$$

Prende anche il nome di
'iperbole riferita agli asintoti'

La funzione che ha come grafico un'iperbole
con asintoti paralleli agli assi cartesiani



$$y = \frac{k}{x-p} + q \qquad y = \frac{ax+b}{cx+d}$$

Prende anche il nome di
'funzione omografica'